Spersacarpine®

OMNIVISION

Collyre

Propriétés/Emploi thérapeutique

Qu'est-ce que le collyre Spersacarpine et quand est-il utilisé?

Le Spersacarpine est destiné au traitement du glaucome (maladie de l'oeil caractérisée par une augmentation de la pression oculaire). Le Spersacarpine ne doit être utilisé que sur prescription médicale.

Complément d'information

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit pour le traitement de l'affection oculaire dont vous souffrez actuellement. Ne l'employez pas pour traiter d'autres maladies ou celles d'autres personnes.

Avis aux porteurs de lentilles

Il est déconseillé de porter des lentilles de contact pendant le traitement, car l'agent conservateur contenu dans les gouttes se dépose dans les lentilles hydrophiles (molles). Les patients qui ne peuvent se passer de leurs lentilles devront les retirer avant l'application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre en place.

Contre-indications

Quand le Spersacarpine ne doit-il pas être utilisé?

Le Spersacarpine ne doit pas être utilisée en cas d'allergie connue ou présumée à l'un des composants, d'inflammation aiguë de l'iris ou de glaucome par blocage pupillaire.

Précautions

Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de l'utilisation du Spersacarpine?

Si vous souffrez d'autres affections (notamment maladie du coeur, asthme, hyperactivité de la thyroïde, ulcère d'estomac, rétrécissements du tube digestif ou troubles de la vidange de la vessie) ou si vous êtes allergique, prenez d'autres médicaments (même en automédication) ou utilisez d'autres médicaments pour les yeux, veuillez le signaler à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous devez utiliser un autre collyre ou une autre pommade ophtalmique en même temps que la Spersacarpine, appliquez ces différents produits à 5 minutes d'intervalle, sauf avis contraire de votre médecin. Si vous commencez à voir tout ou trouble lorsque l'éclairage est faible, attendez au moins 20 minutes avant de vous mettre au volant ou d'utiliser des machines.

Grossesse/Allaitement

Spersacarpine peut-il être utilisés pendant la grossesse ou la période d'allaitement?

La Spersacarpine ne doit pas être utilisée sans autorisation médicale pendant la grossesse ou la période d'allaitement.

Posologie/Mode d'emploi

Comment utiliser Spersacarpine?

Sauf avis médical contraire, instillez 1 goutte 2 à 4 fois par jour dans le cul-de-sac conjonctival (entre l'oeil et la paupière inférieure). Tenez le flacon bien droit juste au-dessus de l'oeil, la tête penchée en arrière, puis, de l'autre main, tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas. Appuyez sur le flacon pour instiller une goutte dans le cul-de-sac conjonctival (ne touchez pas la pipette avec les doigts et évitez qu'elle n'entre en contact avec l'oeil!). Après l'instillation, comprimez le conduit lacrymo-nasal pendant environ 1 minute en appuyant avec le doigt sur l'aile du nez.
Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous pensez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Effets indésirables

Quels effets indésirables Spersacarpine peut-il avoir?

Tous les médicaments pour les yeux contiennent des substances actives susceptibles de passer dans la circulation sanguine et donc de causer des troubles dans n'importe quelle région du corps.
Dans de rares cas, il peut se produire, surtout en début de traitement, un tremblement des paupières, des maux de tête, un larmoiement, des douleurs oculaires ou des crampes pupillaires. Le myosis (contraction de la pupille) est un effet direct de la substance active et provoque le soulagement oculaire souhaité. Toutefois, il peut être à l'origine d'une diminution de la vision dans la pénombre ou l'obscurité ainsi que d'une baisse de l'acuité visuelle chez les patients atteints de cataracte (opacité du cristallin). Un décollement de rétine, effet secondaire extrêmement rare, peut survenir chez des patients prédisposés. Si vous constatez l'apparition d'autres troubles imputables selon vous au Spersacarpine, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Remarques particulières

De quoi faut-il en outre tenir compte?

Afin d'éviter toute contamination du collyre ophtalmique, ne touchez pas la pipette avec les doigts et veillez à ce qu'elle n'entre pas en contact avec l'oeil. Refermez le flacon immédiatement après l'emploi. Ne pas utiliser pendant plus de 4 semaines après ouverture du flacon. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date imprimée sur l'emballage après la mention «EXP».

Conservation/stockage

Conservez le produit dans l'emballage d'origine fermé, à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.
Si le flacon n'est pas vide au bout de 30 jours, veuillez le rapporter au point de vente (pharmacie, cabinet médical) en vue de son élimination adéquate. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Composition

1 ml de collyre contient:
Substance active: pilocarpine 20 mg.
Substances auxiliaires: agent conservateur: chlorure de benzalconium; d'autres substances auxiliaires.

Mode de vente/Présentation

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale.
Flacon de 10 ml (2%).

Distributeur

OmniVision SA, 8212 Neuhausen.

Mise à jour de l'information

Avril 1993.